

پاسخ فعالیت های متن کتاب زمین شناسی سوم تجربی

به نام خداوند بخشندۀ و مهربان

جواب فعالیت ها، فکر کنید و جمع آوری اطلاعات و کتاب زمین شناسی سال سوم تجربی

فصل اول - زمین شناسی و شاخه های آن

پاسخ پرسش صفحه ۲) وجود : آب ، هوا (اکسیژن ، لایه ازن و....) خاک و دمای مناسب از شرایط لازم زندگی بر روی سیاره زمین می توانند باشند.

فصل دوم - آب در هوا

صفحه ۱۵ شکل ۱-۲) رابطه مستقیم وجود دارد. یعنی هر چه هوا گرم تر باشد ظرفیت جذب بخار آب در واحد حجم هوا بیشتر است. و هوا مقدار بخار آب بیشتری نیاز دارد تا به حد اشباع برسد، پس دیرتر به حد اشباع میرسد. و بالعکس

پاسخ پرسش صفحه ۱۶)

هوای داخل اتاق گرم و هوای بیرون سرد است. بنابراین هوای داخل و مجاور شیشه سرد شده و توانایی نگهداری بخار آب کم می شود، دما به پایین تر از نقطه شبنم می رسد، بخار آب اضافی در سطح شیشه پدید می آید . بنابراین مازاد بخار آب را بصورت قطراتی بر روی شیشه بجا می گذارد.

پاسخ فعالیت صفحه ۱۷)

از طریق دستگاه رطوبت سنج سایکرومتر (psychrometer) اختلاف دمای دو دماسنچ تر و خشک را می توان تعیین کرد. وقتی دو دماسنچ یک عدد را نشان دهند، یعنی رطوبت هوا به حد اشباع رسیده است. بنابراین آبی از پارچه خیس (اطراف دماسنچ مرطوب) بخار نمی شود و انرژی از ظرف خارج نمی شود. پس هر دو دماسنچ یک عدد را نشان می دهند. و اگر اختلاف دمای دو دماسنچ زیاد شود، یعنی رطوبت هوا کم می باشد و بالعکس

پاسخ پرسش صفحه ۱۹)

۳=۲۵-۲۸ و یا توجه به جدول صفحه ۱۸ میزان رطوبت نسبی ۷۸٪ خواهد بود.

رانندگان برای ایجاد حالت تعادل دمایی و رطوبتی بین هوای بیرون و دورن ماشین این عمل را انجام مدهند و مانع از رسدن دما به نقطه شبنم می شوند.

فصل ۳ - آب در دریا

صفحه ۲۴

؟ خلیج فارس نسبت به دریاهای آزاد دیگر شوری بالاتری دارد که علت آن واقع شدن در عرض های جغرافیایی پایین تبخیر شدید – وارد نشدن رودهای فراوان به این خلیج و شکل ظاهری آن است(وسعت دهانه ای خلیج فارس در تنگه هرمز نسبت به مساحت کل آن ناچیز است)

دریاهای نزدیک قطب های زمین درجه ای شوری نسبتاً کمی(حدود ۲۰) دارند زیرا در این دریاهای میزان تبخیر کم و بارندگی و ذوب یخ زیاد، از شوری آب می کاهد. در دریاهای نزدیک به استوا اگرچه دما بالا است اما به علت بارندگی زیاد درجه ای شوری از میزان متوسط کمتر است.

اگر از آب خلیج فارس بخواهیم ۶۲ گرم نمک دست آوریم باید ۱/۵۵ کیلوگرم آب را تبخیر نماییم.

صفحه ۲۶ – مقایسه کنید

- بیشترین درجه شوری در حدود عرض های ۲۰ تا ۳۰ درجه ای شمالی و جنوبی (مناطق بیابانی) است که به علت بالا بودن درجه حرارت و در نتیجه افزایش تبخیر و هم چنین کمی بارندگی است.

- بیشترین چگالی آب دریاهای متعلق به نواحی نزدیک به قطب هاست زیرا سردشدن آب سبب افزایش چگالی آب می شود (چگالی آب با دمای ۴ درجه سانتی گرا زیاد است). در ضمن کمترین چگالی را آبهای اطراف استوا دارند زیرا در این مناطق دمای آب زیاد و شوری آب کم است.

- هر چه از استوا دور و به قطب ها نزدیک می شویم درجه ای حرارت آب هم کاهش پیدا می کند. چون زاویه تابش خورشید کمتر می شود.

صفحه ۲۸

؟ اگر این جریانها وجود نداشتند مسلما هر سال درجه ای حرارت نواحی استوایی افزایش می یافت و از درجه ای حرارت نواحی قطبی کاسته می شد و این امر خود بر آب و هوای کره ای زمین اثر می گذاشت.

؟ در این دریا میزان تبخیر بیشتر از میزان آب های ورودی است و به همین دلیل اگر این دریا به اقیانوس اطلس مرتبط نبود، هر سال به درجه ای شوری آن افزوده و از وسعت آن کاسته می شد و در نهایت به یک دریاچه ای بسیار شور تبدیل می گردید.

صفحه ۲۹

؟ آبهای نزدیک قطب جنوب به علت سردی به اعمق اقیانوس آرام نفوذ می کند و با برخورد به بستر اقیانوس و گرم تر شدن آب ها در عرضهای پایین تر دوباره به سمت بالا می آیند و در سواحل نزدیک کشور پر به سطح آب می رستند. این آب ها در حین پایین رفتن اکسیژن با خود می بردند و در هنگام صعود مقداری از املاح کف دریاهای(نیتراتها و فسفاتها) را با خود به سطح آب می آورند. از آنجا که پلانکتونها با این گونه مواد تغذیه می شوند، تعداد آنها در این مناطق افزایش می یابد. چون پلانکتون ها غذای اصلی ماهیها هستند بر شمار ماهیها نیز افزوده می شود.

فصل ۴ – آب در خشکی

صفحه ۳۳

؟ مقدار بارندگی - نوع بارندگی - شیب زمین - درجهٔ تخلخل (میزان تراکم خاک) و درجهٔ نفوذ پذیری - مقدار و نوع پوشش گیاهی - رطوبت اتمسفر - مقدار گیاخاک (هموس) موجود در خاک

صفحهٔ ۳۴

حجم آب، شیب زمین (پستی و بلندی کف بستر رود)، شکل رود (مستقیم یا مارپیچ) و عرض بستر رود (تغییر سرعت در عمق و عرض رود (دیواره، کف وسطح رود))

صفحهٔ ۳۵

برای محاسبه میزان دبی ابتدا $300 \cdot 2 = 600$ می نماییم و سپس $600 \cdot 60 = 36000$ بدست می آید.

؟ خیر - به طور کلی در اغلب رودها از بالا به پایین رود آبده‌ی رفته زیادتر می‌شود زیرا اولاً به سبب به هم پیوستن شاخه‌های فرعی آب رود افزایش می‌یابد. ثانیاً سرعت آب بر خلاف حالت ظاهری آن به طرف پایین رود افزایش می‌یابد. همچنین در بعضی رودها به علت تبخیر زیاد یا نفوذ مقدار زیادی آب به داخل زمین و استفاده از آب به منظورهای مختلف ممکن است آبده‌ی و در نتیجه سرعت رود از بالا رود به پایین رود کاهش یابد.

؟ برای اندازه‌گیری مقدار بارندگی یک حوضهٔ آبریز معمولاً حجم آبی را که در یک سال در سطح حوضهٔ آبریز می‌ریزد را بر وسعت حوضهٔ آبریز تقسیم می‌کنند یا مقدار حجم آبی را که رود در طول یکسال از حوضهٔ آبریز خارج می‌کند به سطح حوضهٔ آبریز تقسیم می‌کنند.

- همان عواملی که در سرعت و حجم آب دخالت دارند؛ از جمله: شرایط اقلیمی- جنس زمین - توپوگرافی- پوشش گیاهی و ...

پاسخ پرسش دو شکل صفحهٔ ۳۸

در شکل سمت چپ: چون اندازه فضاهای زیادتر بوده و این فضاهای ارتباط بیشتری با هم دارند.

صفحهٔ ۴۱

تحقیق کنید

۱- در کشور ما به علت وضع خاص جغرافیایی در اغلب نقاط کمبود باران و آب‌های سطحی وجود دارد. به همین دلیل بهره برداری از آب‌های زیرزمینی، از دیرباز رواج بسیار داشته است.

از این رو، میزان مصرف آبهای زیرزمینی از شمال به جنوب و از غرب به شرق کشور افزایش می‌یابد؛ بنابراین، استان‌هایی مانند کرمان و یزد در مقایسه با سایر استان‌ها از آب‌های زیرزمینی بیشتری (نسبت به آب‌های جاری منطقه) استفاده می‌کنند.

۲- خیر - حریم چاه‌ها باید رعایت گردد. همچنین حجم آبهای زیرزمینی یک منطقه، تقریباً مقدار ثابتی است؛ بنابراین، هر سال حجم معینی از آن را می‌توان بهره برداری کرد. این محدودیت برداشت سبب می‌شود که تعداد چاه‌های عمیق و نیمه عمیق در یک منطقه محدود باشد.

۳- آب‌های زیرزمینی

مقایسه کنید

- آب های زیرزمینی اغلب عاری از جانداران بیماری زاست چون خاک و رسوبات مانند فیلتر عمل می کند و اگر به وسیله ای فاضلاب ها و منابع سطحی آلوده نشده باشد، معمولاً به تصفیه نیاز ندارد. غالباً زلال و بدون رنگ و بو و مواد تیره کننده است. ترکیب شیمیایی و دمای آن نسبتاً ثابت است و تحت تأثیر خشکسالی کوتاه مدت نیست و از نظر املاح آبهای زیرزمینی غنی ترند.

- آبهای جاری حاوی عوامل بیماری زاست زیرا در سطح زمین هستند و توسط انسان ، حیوان و هوا آلوده می شوند. و املاح کمتری نسبت به آبهای زیرزمینی دارند.

۴- تحقیق کنید صفحه ۱

- در حال حاضر مهم ترین یخچال های دائمی ایران در دائمه های قله های علم کوه و تخت سلیمان در استان مازندران قرار دارند و یخچال های دیگری نیز در دائمه های زردکوه بختیاری، سبلان، شمال دماوند، اشترانکوه و شیرکوه دیده می شوند.

- اندازه گیری های جدید نشان می دهد که يخ قطب ها در حال ذوب شدن است. اکنون در افیانوس اطلس شمالی و جنوبی کوه های بزرگ يخ در حال جدا شدن از توده ای اصلی يخ هستند. از طرف دیگر، پیش بینی می شود که طی ۵۰ سال آینده میانگین دمای هوا در کره ای زمین ۴ تا درجه سانتیگراد افزایش یابد. این مسئله سبب خواهد شد که يخ ها با سرعت بیشتری ذوب شوند و در نتیجه، سطح آب دریاها بین ۵ تا ۱۰ متر افزایش یابد. پیش بینی دیگر حاکی از این است که تا ۲۰۳۰ میلادی سطح آب دریاها حدود ۱/۶۸ متر بالا خواهد آمد. با بالا آمدن این مقدار آب، یک چهارم زمین های زراعتی مصر به زیر آب خواهد رفت و ۸ میلیون نفر بی خانمان خواهد شد. در بنگلادلش حدود ۲۰ میلیون نفر، خانه ها و مزارع خود را از دست خواهند داد. در بریتانیا حدود ۱۵ میلیون خانه نابود خواهد شد و از کشور هلند چیزی باقی نخواهد ماند و حدود ۶ شهر از بزرگترین شهرهای جهان غرق خواهند شد.

۵- جمع آوری اطلاعات صفحه ۴

- انسان از دو راه مستقیم و غیر مستقیم سبب به وجود آمدن دریاچه ها می شود. سدسازی روی رودها و جاکردن قسمتی از دریاها از راه های مستقیم تشکیل دریاچه به وسیله ای انسان هستند.

گاهی گودبرداری برای استخراج مواد معدنی، راه سازی و فعالیت های دیگر انسان، سبب بروز زمین لغزه در دائمه دره ها و ایجاد دریاچه می شود.

۶- دریاچه اوان :

- دریاچه های آب شیرین ایران عبارت اند از: دریاچه های پریشان (فامور) در شرق کازرون، زریوار در غرب مریوان، زیلایی (مور زرد زیلایی) در شمال غرب یاسوج، گهر در جنوب اشترانکوه، بزنگان در جنوب کوههای هزار مسجد.*****

- دریاچه های آب نیمه شور ایران عبارت اند از: دریاچه بختگان در غرب تبریز، هامون در دشت سیستان، جازموریان در غرب بلوچستان، هامون مشکل در مرز ایران و پاکستان.

- دریاچه های بسیار شور ایران عبارت اند از: دریاچه ارومیه (شورترین دریاچه ای دائمی ایران)، دریاچه نمک (دریاچه نمک کاشان، دریاچه نمک قم، دریاچه آران، دریاچه ای مسیله) در غرب قم، حوض سلطان (حوض شاهی در شمال قم)، باتلاق گاوخونی در جنوب شرقی اصفهان، مهارلو جنوب شرقی شیراز،

شورابیل در جنوب اردبیل.

- دریاچه هایی که آب آن ها به وسیله‌ی رودها تخلیه می‌شود معمولاً دارای آب شیرین‌اند؛ زیرا تعویض دائمی آب دریاچه از تمرکز زیاد نمک‌ها بر اثر تبخیر جلوگیری می‌کند. در دریاچه‌هایی که زهکشی نمی‌شوند، تبخیر موجب افزایش دائمی نمک‌های موجود در آب می‌شود تا آن که سرانجام مقدار نمک به حد اشباع برسد.

پاسخ به سوالات بخش ۱

صفحه ۶

۱- نابودی جنگل‌ها و استفاده از سوخت‌های فسیلی سبب افزایش گاز‌دی اکسید کربن می‌شود که این گاز بر اثر گلخانه‌ای و افزایش دمای هوا تأثیر مستقیم دارد. استفاده از کودهای شیمیایی، سوموم دفع آفات نباتی و به کاربردن مواد صنعتی دیگر سبب افزایش گاز‌های سمی و از بین رفتن لایه‌ی ازون شده است.

۲- انرژی (خورسید، آب و باد)

۳- با افزایش دما از مقدار رطوبت نسبی کاسته می‌شود، زیرا با افزایش دما رطوبت مطلق هوا نسبت به رطوبت مطلق لازم برای اشباع هوا در آن دما کمتر افزایش پیدا می‌کند.

۴- هر چه رطوبت نسبی افزایش یابد به دمای نقطه‌ی شبنم نزدیکتر می‌شود.

۵- بادها موجب به هم خوردن هوا نزدیک سطح زمین (که سردتر است) می‌شوند و در نتیجه با تعديل درجه حرارت از تشکیل شبنم جلوگیری می‌کنند. همچنین جابجایی هوا باعث پراکنده شدن ذرات بخارآب می‌شود

۶- هوای مرطوب سرد شده و دما به زیر نقطه‌ی شبنم پرسدتا ابر تشکیل شود و ذرات تشکیل دهنده ابر باید به دور ذرات گرد و غبار به هم بچسبند تا به قدر کافی بزرگ و سنگین شوند و سقوط کنند.

۷- هرچه آب شورتر و سرد تر (۴ درجه سانتیگراد) باشد چگالی آن نیز بیشتر خواهد شد.

۸- در قسمت سطحی آب دریا مقدار اکسیژن زیاد است و میزان اکسیژن در اعماق کاهش پیدا می‌کند، چون تولید کننده‌های اکسیژن با افزایش عمق کاهش می‌یابند و تبادل با اتمسفر نیز در اعماق وجود ندارد.

۹- مقدار آب رود- شیب بستر رود- شکل دیواره‌ها و کف رود- عرض رود- پوشش گیاهی

۱۰- خیر- رسوبات رسی با درجه‌ی تخلخل ۰-۵ درصد غیرقابل نفوذند؛ زیرا در آنها فضاهای خالی با یکدیگر ارتباط ندارند. سنگ‌پا و پوکه‌ی معنی هم با درجه‌ی تخلخل زیاد نفوذ نمی‌پذیرند.

۱۱- مقدار تغذیه‌ی آبخوان(از طریق ذوب برف، باران- رود و...) و مقدار تخلیه(خروج طبیعی یا استخراج توسط انسان)

۱۲- خیر - آبهایی که در زیر عمق ۸۰۰ متری قرار دارند، غالباً شورند و با فناوری امروزی استخراج آنها به صرفه نیست. در ضمن از یک آبخوان مقدار معنی آب می‌توان استخراج کرد که به این مقدار "آبدیهی مجاز" گویند. برداشت بیشتر از این حد سبب کاهش ذخیره و در نتیجه افت سطح ایستابی خواهد شد. افت سطح

ایستابی در سواحل دریاها سبب نفوذ آب شور دریا به آبخوان می شود و از کیفیت آب زیر زمینی می کاهد.

۱۳- ترکیب رودهای تغذیه کننده- جنس بستر دریاچه- میزان تبخیر در منطقه- نسبت میزان آبهای ورودی به آب های خروجی - عمر دریاچه

فصل پنجم - کانیها

صفحه ۵۰

? کانی هایی که به آسانی در آب حل می شوند(هالیت) تا زمانی پایدارند که در محیط های دور از آب(بیابان ها، بین لایه های غیرقابل نفوذ) قرار گرفته باشند، چون در صورت وجود آب به صورت محلول در می آیند.

کانی هایی که به سرعت با اکسیژن هوا ترکیب می شوند (الیوین، پیروکسن، آمفیبول و بیوتیت) تا زمانی که دور از اکسیژن باشند(اعماق زمین) پایدار خواهند ماند. و این کانی ها به سطح زمین اگر بررسند با اکسیژن هوا ترکیب شده و معمولاً کانی هایی از قبیل هماتیت و لیمونبت را بوجود می آورند.

? با توجه به تعریف کانی، برخی از موادی که ممکن است ظاهرآ کانی به نظر برسند، واقعاً کانی نیستند؛ شیشه که به طور مصنوعی توسط انسان ساخته می شود، کانی به حساب نمی آیند. آب مایع است ولی یخ دارای تمامی خصوصیات یک کانی هست.

تحقیق کنید صفحه ۵۵

۱- جواهرات سختی های متفاوتی دارند. معمولاً هر جواهر را به وسیله ی جواهری سخت تر از آن برش و صیقل می دهند. الماس جواهری است که برای برش دادن سایر جواهرات از آن استفاده می شود. برای صیقل دادن جواهرت الماس را به شکل پودر در می آورند و از چرخ های آغشته به آن برای بریدن جواهرات و سنگ ها و سایر مواد سخت استفاده می کنند.

تراش دادن الماس به وسیله ی خود الماس انجام می گیرد. سختی الماس در جهات مختلف کمی متفاوت است که از همین خاصیت برای برش دادن و صیقل دادن آن استفاده می کنند.

۲- از الماس به خصوص نوع سیاه رنگ آن برای ساختن سرمته حفاری استفاده می کنند.

از مواد ساینده ی دیگر می توان مخلوطی از کرندوم و مانیتیت را نام برد که از آن ها به طور محدود در ساختن چرخ های آسیاب، پودرهای ساینده و پارچه و کاغذ سنباده استفاده می شود.

از کانی کوارتز و ماسه سنگ کوارتزی برای تمیز کردن و شستشوی ترکیبات، اره کردن سنگ، ساختن کاغذ سنباده، شیشه ساب و سنگ ساب استفاده می کنند.

از گرونا(به عنوان ساینده) عمدتاً برای ساختن کاغذ و پارچه ی سنباده استفاده می کنند.

۳- آگاهی از سختی اجسام برای به کار بردن مواد مختلفی که در کنار هم حرکت می کنند یا می لغزند، ضروری است؛ زیرا در این گونه موارد، سختی های متفاوت مواد سبب خوردگی ماده ی نرم تر توسط ماده ی سخت تر خواهد شد؛ برای مثال، رینگ و سیلندر های موتور اتومبیل ها باید سختی یکسانی داشته باشند. در غیر این صورت، موتور اتومبیل در مدت کوتاهی معیوب خواهد شد.

صفحه ۶۸ – شما تصمیم بگیرید

با توجه به اینکه آزبست به مرور زمان ازبین می‌رود و نیز اینکه خارج نمودن آزبست هم هزینه دارد و هم ممکن است ذرات آزبست در هوا پراکنده شود. بنابراین استدلال گروه دوم صحیح می‌باشد.

فصل ۶ – مأکماتیسم و سنگهای آذرین

صفحه ۷۱

- سیل‌ها ساخت‌هایی هستند که از تزریق ثانوی ماده‌ی مذاب در حد فاصل دو لایه ایجاد می‌شوند. از این‌رو، به آن‌ها "ساخت‌های آذرین لایه رو" نیز می‌گویند. فراوانی این ساخت‌ها در طبیعت نسبتاً کم است. شکل ظاهری آن‌ها ممکن است افقی، قائم یا مایل باشد. آن‌ها در هر حالت،تابع مشخصات لایه‌های اطراف خود هستند. ضخامت سیل ممکن است از چند سانتی‌متر تا چند صدمتر متغیر باشد.

دایک‌ها مهم‌ترین و فراوان‌ترین ساخت‌هایی هستند که از تزریق مأکما به درون شکاف‌ها و شکستگی‌ها به وجود می‌آیند. از این‌رو، به آن‌ها «ساخت‌های شکاف رو» نیز می‌گویند. شکل ظاهری دایک‌ها بیش‌تر قائم یا نزدیک به قائم است ولی ممکن است حتی افقی هم باشند.

فصل ۷ – سنگهای رسوبی

صفحه ۸۶

- بعضی از جانداران دریایی از جاتوران ریز و تک سلولی گرفته تا انواعی مانند مرجان‌ها و اسفنج‌ها، دو کفه‌ای‌ها و جلبک‌ها قادرند یون‌های محلول در آب دریا را جذب کنند و به صورت مواد نامحلول(پوسته، صدف، اسکلت و...) درآورند و بدین صورت از غلظت یون‌های محلول بکاهند. بعضی از جانداران غیر هوازی هم می‌توانند بعضی از مواد معدنی را(برای به دست آوردن اکسیژن) تجزیه کنند و بدین طریق به بعضی از یون‌های محلول آب بیفرایند.

صفحه ۸۶- زیر شکل ۷-۴

به خاطر این درات ریز و درشت را در کنار هم می‌یابیم که انرژی آب بطور ناگهانی کاهش پیدا کرده است.

صفحه ۸۶

? در یک سنگ رسوبی به میزان یک اندازه بودن ذرات «جورشده‌گی» گفته می‌شود. بر این مبنای مجموعه‌ای از ذرات کم و بیش یک اندازه دارای جورشده‌گی خوب و ذراتی با اندازه‌های مختلف دارای جورشده‌گی ضعیف‌اند. میزان جورشده‌گی رسوبات یا سنگ‌های رسوبی آواری اطلاعات زیادی در مورد فرآیند رسوبگذاری و محیط رسوبی فراهم می‌کند. برای مثال، رسوبات بادی و گاهی رسوبات ساحلی معمولاً دارای جورشده‌گی خوب‌اند(یک اندازه). در صورتی که یک رسوب یخچالی ممکن است جورشده‌گی ضعیفی داشته باشد و از کنار هم قرار گرفتن ذرات درشت و ریز درست شده باشد.

صفحه ۹۰

- آرکوز یک سنگ رسوبی آواری دانه درشت است که از کوارتز و فلزپات تشکیل شده است. فلزپات معمولاً به این قبیل ماسه سنگ‌ها رنگ صورتی می‌دهد. در اغلب موارد، طبقات آرکوزی دارای چینه‌بندی توده‌ای هستند. به علت درشت بودن دانه‌های ماسه و رنگ صورتی سنگ، ظاهر این قبیل سنگ‌ها مشابه

گرانیت یا سنگ منشأ آن می شود.

- آرکوزها در فاصله‌ی کمی از سنگ‌های منشأ- یعنی سنگ‌های گرانیتی- در خشکی‌ها تشکیل می‌شوند. وجود فلدسپات نسبتاً زیاد نشان می‌دهد که در محل تشکیل این سنگ آب وجود نداشته است؛ زیرا محل مرطوب و پرآب، فلدسپات‌ها را به کانی‌های رسی تجزیه می‌کند.

صفحه ۹۴- زیر شکل ۷-۷

جواب (پاراگراف آخر صفحه ۹۳ و پاراگراف اول صفحه ۹۴)

فصل ۹- تغییرات سنگها

صفحه ۱۱۱

- سرعت هوازدگی با گذشت زمان کمتر می‌شود؛ زیرا مواد هوازده که روی سنگ جمع می‌شوند، مانع رسیدن عوامل هوازدگی به سنگ‌های زیرین می‌گردند. اما اگر شبی زمین زیاد باشد با گذشت زمان سرعت هوازدگی نیز زیادتر خواهد شد. زیرا مواد هوازده که مانع رسیدن عوامل هوازدگی به سنگ‌های زیرین می‌گردند از منطقه دور می‌شوند.

پاسخ سوالات بخش ۲

صفحه ۱۳۰

۱- زیرا ۹۵ درصد از وزن پوسته‌ی زمین را سنگ‌های آذرین تشکیل می‌دهند و این سنگ‌ها از سرد شدن مگما به وجود آمده‌اند. مسلماً کانی‌های این نوع سنگ‌ها فراوان ترین کانی‌ها در پوسته‌ی زمین‌اند. همچنین می‌توان گفت سنگ‌های آذرین و دگرگونی خود بر اثر تغییراتی در سنگ‌های آذرین بوجود می‌آیند.

۲- سنگ‌هایی که توده‌های ماقمایی را در زیر پوسته در میان گرفته‌اند و حرارت آن را به خود می‌گیرند و در سرد شدن مواد مذاب دخالت دارند.

۳- هالیت، ژیپس، سیلویت، دولومیت، چون یون‌های منفی Cl^- و SO_4^{2-} و CO_3^{2-} در ماقمابسیار کم و در عوض در محیط‌های رسوبی پسیار فراوان‌اند و نیز شرایط تشکیل آنها (تبخیر و اشباع) در سنگ‌های آذرین وجود ندارد.

۴- چگالی نسبی، اسیدکلریدریک.

۵- از ذوب شدن بخشی از سنگ‌های پوسته یا گوشته به وجود می‌آید. عواملی چون افزایش دما، کاهش فشار و آب در به وجود آمدن ماقما دخالت دارند.

۶- چون خاک‌ها در اثر هوازدگی فیزیکی و شیمیایی سنگ‌های مختلف و در محیط‌های گوناگون به وجود می‌آیند، رنگ‌های مختلفی دارند.

۷- پورفیری- نحوه‌ی تشکیل آن: ماقمایی که در محفظه‌ای در اعماق زیاد توقف کرده و در حال سرد شدن است، ناگهان به سطح بالاتر یا به روی زمین منتقل می‌شود. در این حال، بلورهای ریز یا شیشه‌ای که در سطح زمین حاصل می‌آیند، بلورهای درشتی را که در موقع توقف در ماقما به وجود آمده‌اند، در میان می

گیرند.

۸- مانع ای که گرانروی زیاد دارد، وقتی به سطح زمین می‌رسد، گازهای آن به آرامی خارج می‌شود و این سنگ به وجود می‌آید. این سنگ به علت سبکی و سیمان‌گیری خوب در ساختمان سازی(بخصوص در سقف) به کار می‌رود و از آن به عنوان عایق صدا و عایق رطوبت هم استفاده می‌شود.

۹- باطله‌ی آن کم باشد، عیار عنصر ارزشمند آن زیاد باشد، در نزدیک سطح زمین استقرار پیدا کرده باشد، محل آن به راه‌های اصلی و مراکز صنعتی نزدیک باشد، قیمت جهانی آن بالا باشد و...

۱۰- چون فرآیندهای بوجود آورنده سنگ‌های رسوبی(هوازدگی، فرسایش، رسوبگذاری، تبخیر، اشباع و ...) فقط در سطح زمین انجام پذیر است..

۱۱- چون فلزپات‌ها فراوان ترین کانی‌های مانع ای هستند و از تخریب آن‌ها همیشه یک کانی رسی به وجود می‌آید؛ بنابراین؛ کانی‌های رسی فراوان ترین کانی‌های سنگ‌های رسوبی تخریبی‌اند.

کوارتز هم در سنگ‌های آذرین به فراوانی یافت می‌شود؛ بنابراین، با تخریب بیشتر سنگ‌های آذرین، دانه‌های کوارتز از آن‌ها جدا می‌شوند و بیش تر ذرات ماسه را در سنگ‌های رسوبی تخریبی تشکیل می‌دهند.

۱۲- سنگ‌هایی که بافت آواری دارند، از ذرات مختلفی به وجود آمده‌اند که اغلب اوقات با چشم می‌توان آنها را تشخیص داد ولی سنگ‌هایی که بافت غیرآواری دارند، از یک ماده تشکیل شده و متبلورند.

۱۳- چون ماده‌ی اولیه‌ی آنها رسوبات است که منشأ تخریبی دارند و تخریب و فرسایش سنگها فقط در سطح زمین انجام می‌گیرد.

۱۴- بخار اینکه ماده‌ی اصلی این سنگ‌ها که کانی کوارتز است، در برابر عوامل هوازدگی بسیار مقاوم است. بنابراین سنگ‌ها را در محیط‌های رسوبی مختلف و متفاوت مثل سواحل دریا، تلماسه‌ها، دشت‌های سیلانی و دلتاهای به فراوانی می‌توان یافت.

۱۵- چون الیون در دما و فشار زیاد به وجود آمده است، وقتی به سطح زمین که دما و فشار آن کم است می‌رسد، به سرعت تجزیه می‌شود و نمی‌تواند در ماسه سنگ‌ها قرار بگیرد.

۱۶- محیط تشکیل شیل‌ها باید نسبتاً آرام باشد تا ذرات بسیار ریز رس که در آب معلق‌اند، فرصت تهشینی پیدا کنند.

۱۷- ذراتی که قطر آن‌ها از ۱ / ۲۵۶ میلی‌متر کم‌تر باشد و از تجزیه‌ی فلزپات‌ها به وجود می‌آیند.

۱۸- منابع اصلی سوخت‌های فسیلی(نفت، گاز و زغال سنگ) و نیز آب هستند. در مصالح ساختمانی(آهک، سیمان، گچ و...) کاربرد دارند. در صنایع مختلف مانند شیشه سازی، شیمیایی، مواد پاک‌کننده، سفالگری، غذایی، دارویی و... به کار می‌روند. بعضی از فلزات- مانند آهن- را در خود جای داده‌اند و

۱۹- جهت دار؛ زیرا نیرویی که از مغرب به بادکنک وارد می‌شود، بیش تر از نیرویی است که از مشرق به آن وارد می‌آید.

۲۰- سنگ لوح، فیلیت، شیست، گنیس (سنگ هایی که بعضی از کانی های آن ها ردیف شده باشند).

۲۱- یعنی بدون اینکه خود وارد واکنش های شیمیایی شوند، می توانند یون ها را جا به جا کنند یا سبب افزایش دما شوند یا جدا کردن یون ها را آسان کنند.

۲۲- هورنفلس: اگر سنگ های اطراف توده ی نفوذی شیل یا شیست باشند، این سنگ بوجود می آید. دانه ریز، متراکم و غالباً سیاه رنگ است، بافت مضرسی دارد، فاقد هرگونه جهت یافتگی است و به عنوان سنگ تزئینی به کار می رود.

۲۳- دما.

۲۴- شیستوزیته عبارت است از ردیف شدن کانی های ورقه ای در سنگ بر اثر فشار جهت دار. هیچکدام

۲۵- به آسانی به ورقه های نازک متورق می شود؛ چون به آن فشار جهت دار وارد شده است.

۲۶- کوارتزیت؛ زیرا کوارتز از دانه های کوارتز با سختی ۷ و سیمانی با همین سختی ساخته شده و بسیار متراکم است و سیمان به خوبی دانه های کوارتز را درمیان گرفته است؛ در حالی که مرمر فقط از کانی کلسیت با سختی ۳ و بدون سیمان ساخته شده است.

* همواره در اوج باشد*